チ伸ビテ幹モ木質デ有ッテ多年間生存シ人身以上ノ高サニ達スルモノモ珍ラシクナイ此品ハ今ハ園內ニ栽ルコトハ稀デ有ルガ平安朝ノ初メノ頃マデハ園內ニ栽ヱラレタノハ主トシテ此やまはぎデ有ッタデ有ラウカ偶宮城野デはぎガ發見セラレ竟ニ位ヲ之レニ讓リ今日ニ至ッタノデ有ラウ但シやまはぎハ夙ニ伍ニハ落チハシタガ今日デモ偶ニハ栽ヱ賞セラレテ居ル併シ是レハ只好事家ノミデアルガ然シ山野一面此處彼處ニ自然ニ咲キ亂レテ居ル有様ハ又ト得ガタキ秋ノ眺メデアルト謂ハネバナラヌ

○豆州天城山ノ植物

橫濱植物會會員　久内清孝

大正六年八月十一日伊豆狩野川上流ノ寒村湯ケ島ニ宿シ其日淨蓮ノ瀧附近ニ遊ブ附近一帶ノ植物景觀ハ大體關東殊ニ箱根附近ト大差ナシト謂フヲ得ベキモ亦關東ニ求メテ得ラレザル植物ノ種類モ少カラズ

三島驛ニテ東海道幹線鐵道ヨリ輕便鐵道車中ノ人トナリテ大仁ニ向フ途中諸處ニくさぎノ開花セルヲ認ム其花遙ニ之ヲ望メバ滿朶ノ花簇普通ノモノヨリモ靑ク一見くさぎニアラザルカヲ疑ハシム中狩野村附近ニアリテハ普通種ト本品トノ存在ヲ別々ニ認メタリ湯ケ島ニアリテモ諸處ニ此綠色ノモノヲ見ル依テ之ヲ掌上ニ檢スルニ本品ノ萼片ハ普通種ニ比シテ綠色ノ部分多シ余ハ此行湯ケ島ノ下田街道ヨリ吳服店ノ前ヲ右ニ折レ湯本館ニ下ル向陽ノ地ニアリシ二本ノ個體ト更ニ六七町上方ニアル一樹ノ一部トヲ標本トシテ採集シ更ニ中狩野村ニテ普通種ヲモ採集シ兩者ヲ比較セシニ萼ノ綠色勝チナルト毛茸ノ多キトニヨリテ直チニ兩者ヲ區別スルヲ得タリシモ標本トシテハ之ヲ區別スルコト困難トナリタリ愚考スルニ本品ハくさぎノ一品種トナスベキモノナリ敢テ夏月同方面ノ採集ニ從事スル士ノ研究ヲ望ム

湯ケ島ニハたきみしだ、しゝらん、ていしょうさう、再考ヲ期スルかんあふひノ一種ヲ產スル外余ガ今回採集

セルきいちごノ品種 Rubus palmatus THUNB. forma dissecta KOIDZ. ヲ產ス即チきいちごノ葉ノ極端ニ深裂セルモノナリ湯ケ島ヨリ淨蓮ノ瀧ニ到ル途中ニハけやまはんのき、やまもゝ、うんぜんつゝじ、かうぞ、たにうつぎ、うらじろ、いはひめわらび、やのねしだ、おほきじのを、ちゃせんしだ等ヲ見タリ

伊豆湯ケ島附近ノ淨蓮ノ瀧

淨蓮ノ瀧ハ啻ニ瀧其物既ニ羈人ノ杖ヲ停ムルニ足ルノミナラズ更ニ緒鞭ノ徒ヲシテ垂涎萬丈ヲ禁ゼザラシムルモノアリ、先ヅ羊齒中近道稀ニ見ルモノヲ擧ゲンニ牧野氏ニヨリ始メテ土佐ニ發見セラレ宮澤文吾氏ニヨリ湯ケ島ニ藤井潔氏ニヨリ同山中地藏堂ニ見出セラレ更ニ近ク原虎之助氏ニヨリ此瀑下ニ採集セラレタルたきみしだ(Antrophyum japonicum MAKINO.)兒玉親輔氏ニヨリ發表セラレタルみぞし

はひこもちしだ（新稱）

（縮圖）

（清水藤太郎氏撮影）

Woodwardia radicans SM. var. unigemmata MAKINO.
(*reduced.*)

だもどき（Dryopteris izuensis KODAM.）ヲ筆頭ニうらじろ、ほそばかなわらび、たにいぬわらび、さじらん、ひめさじらん、いぶきしだ、おほばやぶそてつ、めやぶそてつ、しろやましだ等ノ産スルアルノ外尙ばりばりのき、うんぜんつゝじ等關東未知若クハ稀有ノ樹木アリ、瀧ニ向ヒテ左ニ廻ハレバ蘚苔群中ニやのねしだアリ叢中しろやましだアリ又みぞしだもどき最モ多シ此附近一帶ハ瀑沫飛來シテ苔滑ラカナリ、然シテ此行余ヲシテ最モ與味ヲ感ゼシメタルモノハ瀧附近ノこもちしだ是レナリ！

本品ハ一見こもちしだニ似タレドモ全形並ニ羽片狹長ニシテ羽片ノ中肋ニ接スル處ニ淡褐色ノ鱗片ニ包被セラレタル肉芽狀態ヲ形成シ其數單ダ一個アリテ能ク發芽シ其地上ニ接セルモノハ完全ニ根ヲ下シ普通ノこもちし

豆州天城山ノ植物

はひこもちしだノ葉ノ上部ニシテ各一ノ胎芽ヲ有ス

(縮圖)　(清水藤太郎氏撮影)

The upper portion of the fronds of Woodwardia radicans Sm. var. unigemmata Makino with a gemma each. (*reduced.*)

だトハ一見其性狀ヲ異ニス全「フロンド」ノ裏面ニハ淡褐色ノ細鱗片ノ散在著生スルヲ見ル之ヲ鏡下ニ檢スルニ其鱗片細胞ノ形狀普通品ト異リテ長シ今本品ヲBeddome氏ノ Ferns of British India ニヨリテ考ルニ Woodwardia radicans ニ擬シ得ラルヽ樣ニ思ハル今該書ヲ按ズルニ"rachis here and there producing large scaly germinating gemmae at the base of some of the pinnae"ノ句最モ能ク本品ヲ說明スルニ似タリ然シテ普通ノこもちしだハ山中他ノ處ニ自生スレドモ淨蓮瀧附近ニハ遂ニ見ル能ハザリキ而シテ余ハ本品ニはひこもちしだノ新和名ヲ下セリ其後牧野氏ハ余ノ採リシ標本ニ基キ其學名ヲ Woodwardia radicans Sm. var. unigemmata

MAKINO. ト定メラル即チ眞正ナル W. radicans SM. 種ハ從來尚未ダ我邦内ニハ得ラレザリシモノニ係ル

翌十二日同行ノ畏友原虎之助、藤井潔ノ兩氏ハ淨蓮ノ瀧ノ上ナル俗稱新田ト稱スル附近ノ山中ニテみどりかなわらび (Polystichum nipponicum ROSENSTOCK.) 並ニ當時盛ンニ開花セルなつえびねヲ採集セリ

此行又つりしゅすらん (Goodyera pendula MAXIM.) ノ著生セルせきこくノ株ヲ擔ヘル樵夫ニ會ヒシヲ以テ試ニ問ヘバ同山ノ産ナリト應ヘタリ由テつりしゅすらんモ亦天城山中ニ産スルコトヲ知リ得タリ其當時樵夫ノ擔ヒシモノハ今腊葉トナリテ原虎之助氏ノ藏スル所トナレリ、尚天城山ニハ往年藤井潔氏ノ採集ニ係ル苔類ノ一種 Plagiochila amagiensis STEPH. アリ本種ハ從來未ダ曾テ他ニ産スルノ報ニ接セザル一品ニ屬ス

○斷枝片葉（其八）

牧野富太郎

●きんぎょもノ名ノ間違　今日植物學上一般ニ呼ンデ居るきんぎょもノ名ハ間違デ本當ハほざきのふさもガきんぎょもデアラネバナラヌソシテ今日言フきんぎょもハ實ハきんぎょもデナクまつもト云フ者デアル

●とちかがみノ意義　とちかがみ科（水鼈科）ノ水草ニとちかがみ（學名ハ Hydrocharis Morsus ranae L. var. asiatica MAKINO.）ト云フモノガアルとちトハ泥龜ヲ尾州デとちト云ヒかがみハ其葉面ニ光澤ガアルカラデ即チすつぽんノ鏡ノ意デとちかがみト呼ンダモノデアル又之ヲすつぽんのかがみト云フ處モアル又此草ニハどうがめのかがみ、どうがめばす、すっぽんのかさ、かへるゑんざナド各地ノ方言ガ頗ル多イ

●簾ノ一原料　武州南多摩郡原町田ノ邊デハ土人ガ七月頃其附近ノ原野并ニ丘陵邊ニ野生スル方言はぎナルめどはぎ（Lespedeza sericea MIQ.）ノ能ク伸ビタル莖ヲ採リ集メ葉ヲ去テ日乾シ束ネテ售ル其價一束金三十錢許デアル其能ク枯槁セルモノヲ次年ニ於テ簾ニ製スルノデ之ヲ東京市神田區豊島町邊ノ簾屋ヘ廻送スル